



واکسن های کووید 19 – آنچه که لازم است بدانید

- واکسن می تواند از ابتلای افراد به کووید 19 جلوگیری کند اگر افراد مبتلا نشوند، واکسن همچنان می تواند مانع از بیماری شدید آنها در نتیجه کووید 19 شود.
- فایزر یک واکسن mRNA است. امکان ابتلا به کووید 19 به واسطه دریافت این واکسن وجود ندارد.
- کودکان زیر 5 سال باید دو دوز واکسن فایزر مخصوص اطفال بزنند تا واکسیناسیون آنها تکمیل شود. 14 روز بعد از دوز دوم کاملاً واکسینه هستید.
- اگر فرزندان 5 تا 11 ساله است و هر دو دوز واکسن را قبل از 12 سالگی دریافت کرده است، دو دوز واکسن اطفال دریافت می کنند. اولین دوز آنها باید حداقل با 8 هفته فاصله باشد.
- اگر فرزندان دوز اول را در سن 11 سالگی دریافت کرده است، واکسن اطفال را برای دوز اول دریافت می کند. اگر تا زمانی که دوز دوم را دریافت کند 12 ساله شده باشد، دوز دوم واکسن مخصوص بزرگسالان را دریافت می کند. بین این دو دوز باید حداقل 8 هفته فاصله باشد.
- اگر فرزندان بالای 12 سال است، دو دوز واکسن بزرگسالان را حداقل با 28 روز فاصله دریافت می کند. اما توصیه می شود بین دوزها 8 هفته فاصله باشد.
- ویروس کووید 19 تغییر می کند. به حالت های مختلف واکسن "واریانت" گفته می شود. بعضی از واریانت ها مثل دلتا مسری تر هستند و می توانند تأثیر بیشتری روی کودکان و جوانترها داشته باشند. واکسن های کووید 19 باعث محافظت در برابر واریانت ها می شوند.
- اطلاعات بیشتر برای پشتیبانی از کودکان و دریافت واکسن در این آدرس موجود است:
<https://novascotia.ca/coronavirus/vaccinate-ns/>



دریافت واکسن کووید 19

- واکسن کووید 19 رایگان است. همه افراد 5 ساله و بالاتر در نووا اسکوشیا می توانند در صورت تمایل واکسن بزنند.
- کودکان برای اینکه کاملاً واکسینه شود باید دو دوز واکسن بزنند. 14 روز بعد از دوز دوم کاملاً واکسینه هستید.
- اکیداً توصیه می شود به صورت آنلاین در این سایت برای کودکان وقت بگیرید novascotia.ca/vaccination
 - برای رزرو وقت به صورت آنلاین به کارت سلامت نووا اسکوشیا و آدرس ایمیل یا شماره تلفن نیاز دارید
- اگر نمی توانید آنلاین رزرو کنید، می توانید به صورت تلفنی برای فرزندتان وقت بگیرید. با شماره **1-833-797-7772** (رایگان) تماس بگیرید
 - برای رزرو وقت به صورت تلفنی به کارت سلامت نیاز نیست
 - وقتی با این شماره تماس گرفتید می توانید درخواست کنید مترجم با شما صحبت کند
- کودکان و جوانان نیز مانند بزرگسالان ممکن است عوارض جانبی خفیفی مثل درد عضلات، خستگی، تب خفیف و درد در محل تزریق واکسن در دست را احساس کنند. این حالت ها طبیعی است. این حالت ها به این معنی است که واکسن در حال تأثیرگذاری است و به بدن در حال یادگیری نحوه مقابله با ویروس است.

