

Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes

Les vaccins inclus dans ce programme sont offerts gratuitement.

Les enfants, les jeunes et les adultes dont l'état de santé est à risque élevé pourraient devoir recevoir des doses supplémentaires et être admissibles à des vaccins supplémentaires ou différents. Pour obtenir plus d'information, consultez votre fournisseur de soins de santé ou le [bureau de la Santé publique](#) de votre région.

Vaccins pour les enfants

| | Calendrier | | | | | |
|---|------------|--------|--------|---------|---------|------------|
| | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 4 à <7 ans |
| Antigrippal* | | | * | | | |
| DCaT-VPI-Hib Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche acellulaire, la polio et l' <i>Hæmophilus influenzae</i> de type b | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| RV Rotavirus | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Pneu conj. Vaccin conjugué 15-valent contre le pneumocoque | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Men C conj. Vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe C | | | | ✓ | | |
| RROV Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle | | | | ✓ | ✓ | |
| dcaT-VPI Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche acellulaire et la polio | | | | | | ✓ |

* Pendant chaque saison de la grippe pour tous les enfants de 6 mois ou plus. Les enfants de moins de 9 ans qui reçoivent un vaccin antigrippal pour la première fois doivent recevoir deux doses.

Vaccins administrés à l'école

| | 7 ^e année | |
|--|----------------------|---|
| VPH Vaccin contre le virus du papillome humain (2 doses) | ✓ | ✓ |
| Hépatite B Vaccin contre l'hépatite B (2 doses) | ✓ | ✓ |
| dcaT Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire | ✓ | |
| Méningococcique quadrivalent Vaccin quadrivalent contre le méningocoque (groupes A, C, W et Y) | ✓ | |

Vaccins pour les adultes

| | Calendrier | |
|--|------------------|---------------------------|
| | Tous les adultes | Adultes de 65 ans ou plus |
| Antigrippal Chaque saison de l'influenza | ✓ | |
| Antigrippal renforcé Chaque saison de l'influenza | | ✓ |
| dcaT* Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire (une dose à l'âge adulte 10 ans après l'administration d'un vaccin contre le tétanos) | ✓ | |
| dT Vaccin contre le tétanos et la diphtérie (aux 10 ans) | ✓ | |
| Pneu conj. Vaccin conjugué 20-valent contre le pneumocoque | | ✓ |
| RRO Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (deux doses pour les personnes nées en 1970 ou à une date ultérieure) Consultez la politique sur l'admissibilité aux vaccins financés par le gouvernement en N.-É. (en anglais seulement) pour en savoir plus. | ✓ | |

* Peu importe l'âge, le vaccin dcaT doit être offert à chaque grossesse.