

# Renseignements importants au sujet de l'infection à méningocoque groupe C et du vaccin conjugué contre le méningocoque **groupe C**

## À LIRE ATTENTIVEMENT

### Qu'est-ce que l'infection à méningocoque groupe C?

- L'infection à méningocoque groupe C est causée par une bactérie (*Neisseria meningitidis*) connue sous le nom de méningocoque.
- De nombreuses personnes sont porteuses de la bactérie, au fond de la gorge ou dans le nez, sans être malades.
- Parfois, il arrive que cette bactérie outrepassse les défenses naturelles du corps et cause des maladies graves comme la méningite (infection des membranes du cerveau) ou la méningococcémie (infection généralisée qui affecte le sang et plusieurs organes).
- Le groupe C est l'une des souches de la bactérie qui cause l'infection à méningocoque.
- Cette infection peut être mortelle.
- Certains enfants peuvent devenir sourds ou subir des lésions aux reins, des amputations ou des pertes auditives.
- La maladie peut être prévenue par un vaccin.

### Qu'est-ce que le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C?

- Le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C est destiné à la prévention de l'infection causée par la souche du méningocoque groupe C.
- Il protège uniquement contre la maladie causée par la souche du groupe C.
- Il ne protège pas contre d'autres souches de cette bactérie ou contre d'autres organismes capable de causer une méningite ou une septicémie.
- Ce vaccin est administré par injection et ne peut pas provoquer d'infection à méningocoque groupe C car il ne contient pas de bactéries vivantes.

### Qui devrait recevoir le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C?

Le calendrier de vaccination de la Nouvelle-Écosse recommande que ce vaccin soit administré aux bébés âgés de 12 mois.

## ATTENTION

**CERTAINES PERSONNES DOIVENT CONSULTER UN FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ AVANT DE RECEVOIR CE VACCIN :**

- les personnes atteintes de thrombocytopénie ou d'autres troubles de saignement.

### Qui ne devrait PAS recevoir le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du conjugué contre le méningocoque groupe C.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 39,5 °C/103 °F ou plus).

*Veillez lire le verso.*

# À quoi peut-on s'attendre après l'administration du vaccin contre le méningocoque groupe C?

## RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS

Votre enfant a reçu le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C. Ce vaccin est important pour protéger votre bébé ou votre enfant contre l'infection à méningocoque groupe C.

***Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller la possibilité d'une réaction au vaccin. Comme dans le cas de tout autre vaccin, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.***

### Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

De nombreux enfants ne ressentent aucun effet secondaire après la vaccination. Toutefois, certains symptômes peuvent survenir :

- Un effet secondaire commun est une rougeur ou une enflure au site d'injection.
- Une fièvre et de l'irritabilité ont été observées chez les enfants plus jeunes de 4 à 6 heures après l'injection, mais ne durant pas plus de 24 heures. Cela peut survenir si l'enfant ne prend pas d'acétaminophène.
- Les adolescents peuvent ressentir des maux de tête et de la fatigue.

***Puisqu'il est possible qu'une fièvre se produise, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les directives pour chaque produit. Ne prenez pas ces médicaments si vous êtes atteints de certains troubles médicaux. Consultez votre fournisseur de soins de santé afin de discuter de vos antécédents médicaux avant d'utiliser ces médicaments.***

### Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si :

- la fièvre dure plus de 24 heures;
- votre enfant a une température de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne s'améliore pas après l'administration de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène;
- votre enfant souffre de convulsions;
- votre enfant semble souffrir d'autres symptômes.

### Questions?

Si vous avez des questions concernant le vaccin conjugué contre le méningocoque groupe C, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web :

- d'Immunisation Canada à l'adresse [immunize.ca/fr/default.aspx](http://immunize.ca/fr/default.aspx)
- de l'Agence de santé publique à l'adresse [phac-aspc.gc.ca](http://phac-aspc.gc.ca)
- de la Société canadienne de pédiatrie à l'adresse [cps.ca/fr/](http://cps.ca/fr/)
- du service 811 à l'adresse <https://811.novascotia.ca/fr>