

Renseignements importants sur **la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la polio** ainsi que sur le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire, le tétanos et la polio (dcaT-VPI)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT.

Qu'est-ce que la diphtérie?

- La diphtérie est une maladie très grave.
- Elle cause une infection des voies nasales et de la gorge qui peut affecter la respiration.
- Elle peut causer une infection de la peau.
- Elle peut causer une insuffisance cardiaque ou la paralysie.
- Environ une personne sur 10 atteintes de la diphtérie en meurt.
- Il est possible de prévenir la diphtérie par la vaccination.

Qu'est-ce que la coqueluche?

- La coqueluche peut provoquer de graves crises de toux qui peuvent affecter la respiration et durer des semaines, voire des mois.
- Elle peut entraîner une pneumonie.
- Elle peut entraîner des convulsions et, dans certains cas, la mort.
- Il est possible de prévenir la coqueluche par la vaccination.

Qu'est-ce que le tétanos?

- Le tétanos est une maladie qui survient quand une coupure ou une blessure est infectée par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, qui se trouve souvent dans la terre, sécrète un poison qui entraîne des spasmes musculaires.
- Il peut s'agir d'une maladie mortelle.
- Il est possible de prévenir le tétanos par la vaccination.

Qu'est-ce que la polio?

- La polio est une maladie virale qui peut causer une infirmité permanente, voire la paralysie.
- La paralysie peut affecter les muscles nécessaires pour respirer.
- La polio a été éliminée au Canada grâce à la vaccination.

En quoi consiste le vaccin dcaT-VPI?

- Le vaccin dcaT-VPI offre la meilleure protection contre ces maladies.
- C'est la combinaison de quatre vaccins en un.
- Il est administré par injection.

Qui devrait recevoir le vaccin dcaT-VPI?

- On recommande une dose du dcaT-VPI pour les enfants qui ont entre 4 et 6 ans.

ATTENTION

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin dcaT-VPI?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin dcaT-VPI.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 39,5 °C/103 °F ou plus).

Effets secondaires possibles

Beaucoup d'enfants n'ont aucun effet secondaire après avoir été vaccinés. Toutefois, certains peuvent avoir les effets secondaires suivants :

- Une légère douleur, une rougeur ou de la sensibilité au point d'injection. Votre enfant pourrait ne pas vouloir utiliser le bras qui a reçu l'injection autant que d'habitude. Tout cela devrait disparaître après quelques jours.
- L'enfant pourrait être irritable et manquer d'appétit.
- Il pourrait se former un petit nodule indolore au point d'injection qui pourrait prendre quelques semaines à se résorber.
- L'enfant pourrait faire de la fièvre dans les 6 à 24 heures qui suivent l'injection, mais la fièvre ne devrait pas durer plus de 24 heures.
- Dans de rares cas, on a rapporté des effets secondaires plus graves, tels qu'une forte fièvre et des convulsions.

Veillez lire l'information au verso.

À quoi peut-on s'attendre après l'administration du vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire, le tétanos et la polio (dcaT-VPI)?

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT.

Les gens devraient rester à la clinique pendant au moins 15 minutes après avoir reçu un vaccin quel qu'il soit au cas où ils auraient une réaction. Comme c'est le cas avec tout autre vaccin, il existe une petite possibilité d'avoir une réaction plus grave.

Comme il est possible d'avoir la fièvre, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions qui accompagnent le produit. Si vous souffrez de certains troubles médicaux, vous ne devriez pas prendre ces médicaments. Mentionnez vos antécédents médicaux à votre fournisseur de soins de santé avant de prendre l'un ou l'autre de ces médicaments.

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si :

- la fièvre persiste après 24 heures;
- la température de votre enfant est de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène;
- votre enfant souffre de convulsions;
- votre enfant semble souffrir d'autres symptômes.

Questions

Si vous avez des questions au sujet de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de la polio ou du vaccin dcaT-VPI, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique ou votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, consultez les sites

Web suivants :

- Immunisation Canada, immunize.ca/fr/default.aspx
- Agence de la santé publique du Canada, phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
- La Société canadienne de pédiatrie, cps.ca/fr/
- 811, <https://811.novascotia.ca/fr>