

Programme de vaccination pour les enfants, les jeunes et les adultes

Les vaccins inclus dans ce programme sont offerts gratuitement.

Les enfants, les jeunes et les adultes dont l'état de santé est à risque élevé pourraient devoir recevoir des doses supplémentaires et être admissibles à des vaccins supplémentaires. Pour obtenir plus d'information, consultez votre fournisseur de soins de santé ou le [bureau de la Santé publique](#) de votre région.

Vaccins pour les enfants

	Calendrier					
	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	18 mois	4 à 6 ans
Antigrippal*			*			
DCaT-VPI-Hib Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche acellulaire, la polio et l' <i>Hæmophilus influenzae</i> de type b	✓	✓	✓		✓	
Pneu conj. Vaccin conjugué contre le pneumocoque	✓	✓		✓		
Men C conj. Vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe C				✓		
RROV** Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle				✓	**	
dcaT-VPI Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche acellulaire et la polio						✓

* Pendant chaque saison de la grippe pour tous les enfants de 6 mois ou plus. Les enfants de moins de 9 ans qui reçoivent un vaccin antigrippal pour la première fois doivent recevoir deux doses.

** La deuxième dose du vaccin RROV peut être donnée entre 18 mois et 6 ans.

Vaccins administrés à l'école

	7 ^e année
VPH Vaccin contre le virus du papillome humain	✓
Hépatite B Vaccin contre l'hépatite B	✓
dcaT Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire	✓
Méningococcique quadrivalent Vaccin quadrivalent contre le méningocoque (groupes A, C, Y et W 135)	✓

Vaccins pour les adultes

	Calendrier	
	Tous les adultes	Adultes de 65 ans ou plus
Antigrippal Chaque saison de la grippe	✓	
Antigrippal à forte dose*		*
dT Vaccin contre le tétanos et la diphtérie (aux 10 ans)	✓	
dcaT** Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire (si ce vaccin n'a pas été administré à l'âge adulte, une dose 10 ans après l'administration d'un vaccin contre le tétanos)	✓	
Antipneumococcique polysaccharidique Vaccin antipneumococcique polysaccharidique		✓
RRO Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (deux doses pour les personnes nées en 1970 ou à une date ultérieure)	✓	

* Chaque saison de la grippe pour les résidents des établissements de soins de longue durée (foyers de soins infirmiers et établissements de soins pour bénéficiaires internes) seulement.

** Peu importe l'âge, le vaccin dcaT doit être offert à chaque grossesse.